

PAKETBLATT: INFORMATIONEN FÜR BENUTZER / PATIENTEN

DANABOL 10 mg Filmtabletten

DANABOL 50 mg Filmtabletten

Metandienon

Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie beginnen

Beginnen Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels, da es Informationen enthält Ihnen wichtig.

— Bewahren Sie diese Broschüre auf. - Möglicherweise müssen Sie sie lesen.

— Wenn Sie zusätzliche Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt von Ihrem-oder-Apotheker-oder-Krankenschwester-Praktiker.

— Dieses - Medikament - wurde nur für Sie verschrieben.

voasträ.-nicht-muss-andere-persoane geben.-Le-kann-schlecht machen - selbst wenn sie die gleichen Anzeichen der Krankheit wie Sie haben.

— Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen haben, - wenden Sie sich an Ihren Arzt Sie - oder - Apotheker - oder - Krankenschwester. -

Diese umfassen alle möglichen Nebenwirkungen, die nicht erwähnt werden diese-Perspektive.-Standpunkt-I-4.

Was Sie in dieser Broschüre finden:

1. - Was - ist - Danabol - und - für - was - ist

2.- Was Sie wissen müssen, bevor Sie Danabol verwenden

3.- Verwendung von Danabol

4.- Mögliche Nebenwirkungen

5.- Wie man Danabol hält

6.- Inhalt - der Verpackung - und - anderer - Informationen

1. Was Danabol ist und wofür es verwendet wird

Danabol-Tabletten - können während der Therapie verwendet werden Reperieren Sie die Pathologie, begleitet von einer Störung der Proteinsynthese - Kachexie-der-verschiedenen-Genese-Traumele, -arsurile, -perioadele-pre - und-postoperative Krankheiten, infektiös durch Bestrahlung, Re-Insuficiența nal-and-adrenal-gușa-toxisch -distrfia-muskel -osteoporoză, -gleichgewichtsnitrat-negativ-zur-Therapie-zu-Steroiden, -anämie-hypo- und aplastisches Adjuvans zur Behandlung von TB-Osteo mellitus, -astmului-bronchial -hepatitei.-

2. Was Sie wissen müssen, bevor Sie Danabol verwenden

Verwenden Sie nicht Danabol:-

— wenn- Sie allergisch sind (überempfindlich) - gegen den Wirkstoff oder alle anderen Komponenten der Zubereitung Danabol.

— wenn - Sie - schwanger sind - oder - stillen.-

— zusätzliche - Kontraindikationen - sind - Prostata - Karzinom - oder- Brustkrebs bei Männern, ischämische Herzkrankheit, Arteriosklerose cleroză-schwere -insuficiența-Leber-und-Niere -prostatita-acute- und chronisch.

Danabol-Tabletten-werden-nicht-für-Kinder-und-Ado- empfohlen Lescenti-of-Age-in-18-Jahren -datorită-Mangel-Daten-auf-Sigu-Ranta-und-Wirksamkeit.

Seien Sie besonders vorsichtig mit Danabol Tabletten

Es ist verboten, die empfohlenen Dosen zu überschreiten.

Vorbereitung - bei Frauen muss als erwarteter Nutzen bewertet werden und

Risiko-mögliche-Behandlung-mit-dem-Anblick-Aktion-androge-prăparatului.-na-zum-ersten-Auftauchen bei-Zeichen-der-Pazi-Virilisierung entelor- (Verdickungsstimme-Hirsutismus, -knie, -klitoromegalie) -adminstrarea-must-stop-um irreversible Veränderungen zu vermeiden.

Die Vorbereitung erfolgt durch Vorsicht, um die Funktion zu beschädigen.

Tausende -hipertensiune-Druck, -afectarea-Funktion-Leber-und-Niere -

Epilepsie, Migräne und Glaukom (Spannungsookular), einschließlich antecedente.-On-während-der-Behandlung-wird-empfohlen-Kontrolle systematisch-das-Blut-intraokular-die-Ursache-Retention-möglich-a-Natrium und Wasser im Körper. Es ist möglich, sich zu ändern

Leberfunktion, daher-eine-Heilung-nach-Behandlung-um-4-pro-Woche die Hände-empfohlene-Kontrollfunktion-Hepaticae.-vor-dem-zum-Ursprung Behandlung und anschließend -auf-während-zu-empfehlen-efectuarea-Kontrolle der rektalen Prostata.

In-Diabetes-Mellitus-wird-empfohlen-angepasst-Dosis-Präparatelor- empfohlen antihyperglykämisch.

Bei-Patienten-mit-bösartigen-Tumor-Behandlung-Dauer-den-Willen-abschrecken- Hand-in-ein-Individuum-und-in-Funktion-von-Parametern-hepatici.-A-SE- Kontroll-systematische Lipidämie und Cholesterin.

Verwendung anderer Arzneimittel

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich eingenommen haben, einschließlich - von - denen - ausgestellt - ohne Rezept.

Andere Medikamente, die den Blutzuckerspiegel senken

Antidiabetika und sogenannte Derivate von Cumarin-verwendet für

a - verhindern - Blutgerinnung - kann - die Wirkung - auf - Danabol beeinflussen. -

Auch Danabol-kann-Potenz-hepatotoxische Wirkung-die-Unor-Drogen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach

Empfehlungen-vor-der-Einnahme-eines-Medikaments.-Danabol-nicht-tre-

Buie-in-Use-Time-Load-and-Lactation.

Maschinen fahren und benutzen

Die Behandlung durch Danabol hat keine Auswirkungen auf die Kapazität. of-the-drive-Fahrzeuge-und-zu-Gebrauch-Maschinen.

Wichtige Informationen zu einigen Inhaltsstoffen von Danabol

Tabletten-Danabol-haltige-Lactozä.-Patienten-durch-Krankheit-ereditare-seltene-der-Galactose-Intoleranz, -defizit-von-Lactazä- (Lapp) - oder Malabsorptions-Syndrom-der-Glucose-Galactose-nicht-sein-il benutze-diese-Medizin.

3. Verwendung von DANABOL

Danabol-muss-immer-verwendet werden, um-in-way-and-pen- zu dosieren Tru-Zeitraum-des-Arzt-es-verschrieben Sie.

Die übliche Dosis ist wie folgt:

--- Erwachsene Anfangsdosis-10-20-mg / zi.-

Die Dosiserhaltung beträgt-a-5-10-mg / zi.-

--- Maximale Dosis 50 mg / 24 Stunden.

Das Heilmittel --- bis zu 4-săptămâni.-

Die Heilung kann über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen wiederholt werden.

Art der Verabreichung

Be-about-oral -. -Tabletten-beschichtet-be-in gegeben werden

JOEL-ganz-mit-einer-Menge-Lichid.-ausreichend Comprimatele-

nicht unterteilt werden, -sfărâmate-or-gekaut werden.

Wenn Sie mehr Danabol verwendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie mehr Tabletten eingenommen haben oder denken, dass Sie mehr Tabletten eingenommen haben

Danabol - als - sollte (Überdosierung), - sagen Sie - Ihrem Arzt sofort -

Sie - oder - gehen zur nächsten Einheit

Bringen Sie die Verpackung oder die restlichen Medikamente mit.

Ihre.

Fälle von Überdosierung wurden nicht gemeldet. Bei Missbrauch hergestellt-welches-Metandienon enthält- (Großdosis-Verabreichung, die Qualität der Heilung-anabolen) Reaktionen -es-Register-nachteilig-schwerer endokriner Metabolit und psychisch.

Wenn Sie vergessen, Danabol zu nehmen

Wenn Sie eine Einzeldosis einnehmen möchten, die Sie verpasst haben - Nehmen Sie weg, was Sie aminieren.

țiți.-mit-all-diesen-kommen-wenn-Zeit-zu-verwalten-

schlechte Dosis-nächste-keine-Mai-Dosis nehmen omisă.-keine-Dosis-Einnahme

Doppelte Kompensation einer vergessenen Dosis.

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich diese Medien an.

Produkt von -adresați Ihrem-Ihrem-Arzt-oder-Apotheker.

Wenn Sie aufhören, Danabol einzunehmen

Sie müssen Danabol so lange verwenden, wie Sie möchten.

angezeigt - Ihr Arzt. - Nicht abbrechen - Verabreichung -

drogenfrei-zu-reden-Mai-zuerst-zum-Arzt-dumnea-

Ihr-oder-Apotheker.

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich diese Medien an.

Produkt von -adresați Ihrem-Ihrem-Arzt-oder-Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Als All-Medikament-Danabol-kann-Reaktion-Werbung-verursachen-

ist, mit all dem, was niemals allen Menschen erscheint.

Danabol-Tabletten-in-therapeutischen Dosen-ist-weniger-wahrscheinlich-il

Ursachen - Nebenwirkungen. - Während - längerer Behandlung -

Die folgenden Nebenwirkungen wurden beobachtet.

Nibia-of-Data-Rate):

Lebertumoren.- Bei- älteren- Hypertrophie- und / oder- Karzinom- von- Prostata.

Änderungen in der Blutanalyse, -koagulare-niedrig-zu-Blut-mit-

Trend-the-Blooding.

Side-by-Hipersensibilitate.-

Gonadotropinei - Sekretionsunterdrückung (de-stimulierendes hormon-sexuelles).

Bei Frauen *treten* Anzeichen einer Virilisierung auf (z. B. Akne, Hirsutismus,

Alopezie-eine-Art-männlich -ingroșarea-irreversibel-eine-Stempelstimme -

Dysmenorrhoe, -hipertrofia-Klitoris) .- Răgușirea-kann-sein-erstes-Sem-

al-change-Ton, der langfristig und ungleichmäßig sein kann

irreversibel.

Amenorrhoe-und-Spermatogenezei.-Ginecomastie-Hemmung (mărirea-

Drüsen und Brust) bei Männern.

Change-Libido.

La-Boys-of-Age-präpubertär the-can-see-erection-frecvente-

und Penis-zu-Mädchen erhöhen - Tritthaarigkeit-Scham-und-

Klitorishypertrophie.

Retention, Ödeme, Flüssigkeit-zu-Peripherie -hipercalcemie- (mărirea-

Kalziumionen des Blutes) - die Männer und Frauen --- Progressions-Atero-

sclerozei- (Krankheit-der-Unterwerfung-ein-Fett-zu-Intima-Vaselor-

Arterien genannt).

Übelkeit, - Wir reduzieren die Lust am Essen.

Störungsfunktion-Leber-Colestază- (Schwierigkeit-von-Eliberare-

zum Ball) - icter- (gelber Farbstoff in der Haut).

Akne-Hirsutismus- (abnormales Wachstum der Haare) -nesemnificativ.

Retention Natriumionen von Wasser und Körper.

Erhöhung der Konzentration von Parametern in der Biochemie (ureei-

im Blut, -able-Nitrat-positiv, -hipercalcemie) -in-special-to-pacien-

Halten Sie, -die-eine-Diät-trifft-streng-zu-Bett-und-bei-Patienten-mit-Krebs-

Brustmetastasen.-Modificarea- (positiv) -indicilor-Leber-Funktion.
Wenn irgendwelche Nebenwirkungen schwerwiegend sind oder wenn ob
Servieren Sie die All-Pass-gelisteten Side-to-the-Leaflet-, -vã-
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen melden

Wenn Sie Nebenwirkungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
Sie - oder - der Apotheker. - Dazu gehören - alle - möglichen
Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht erwähnt sind.
Sie können Nebenwirkungen von der Systematik in Beziehung setzen
Verbleibende-nationale-de-Berichterstattung -ale-Details-die-veröffentlicht-am-
Website-Agentur-Arzneimittel-und-Medizinprodukte -
www.amed.md-or-email: -farmacovigilenta@amed.md
Durch die Meldung von Nebenwirkungen können Sie zur Bereitstellung von beitragen
Zusätzliche Informationen zur Arzneimittelsicherheit.

5. Wie man Danabol aufbewahrt

Ein Copiilor, der den Anblick und die Reichweite nicht zulässt.
A, um den Ort des Lichts geschützt zu halten und die Temperatur unter 25 ° C zu halten.
Verwenden Sie Danabol nicht nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum.
das Ablaufdatum nach "EXP" .-- um sich auf den letzten Tag der Frage zu beziehen.
Nicht notwendig-sind-spezielle-Bedingungen-von-pãstrare.-Medicamentele-
darf nicht über häusliches Abwasser oder Rückstände entsorgt werden.
menajere.-Fragen Sie Ihren Apotheker, wie man Medikamente entfernt.
Das-nicht-dein-Mai-ist-notwendig.-Diese-Maßnahmen-helfen-dem-Schutz-
die Spülmedien.

6. Paketinhalt und andere Informationen

Was Danabol enthält

Wirkstoff ist Metandienon.
1 das Kompressionsfilm-Metandienon enthaltende 10 mg, 50 mg oder.
Die anderen Komponenten sind:

Ader

Das Magnesiumstearat -Kollidon-CL (Crospovidon) - Ludipress- (Lactozã-
Monohydrat, -polividonã, -crospovidonã).

Film

Copolymer aus Polyvinylalkohol und Polyethylenglykol, Talkum,
Titanoxid, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Farbstoff
FD & C Red-N.40, gelb gefärbt von Chinolin.

Wie Danabol aussieht und Inhalt der Packung

Filmbeschichtet-rund-bikonvex-von-Farbe-rosa-rot.
In-Querschnitt-Inhalt-der-internen-Tablette-ist-
von weißer Farbe.

Packungsinhalt

Danabol 10 mg Filmtabletten

By-25-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.
4 Blasen zusammen mit der Patientenbroschüre
bringt Kindern einen Sinn für Papp bei.

Danabol 50 mg Filmtabletten

By-20-beschichtete Tabletten aus PVC / Al-Bliester.
3 Blasen zusammen mit der Patientenbroschüre
bringt Kindern einen Sinn für Papp bei.

Inhaber der Zulassungsbescheinigung und Hersteller

Inhaber der Registrierungsbescheinigung

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL
str.-N-Grãdescu, -4, -MD-2002 -oder.-Chisinau, Programm der Republik Moldau

Der Hersteller

SC-Balkan-Pharmaceuticals-SRL
str.-Industrial -7 / A -MD-2091, -oder.-Singera Republic Programm Moldawien

Dieser Prospekt wurde im Dezember 2018 genehmigt

Detaillierte Informationen über die Medizin sind verfügbar
auf der Website der Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte
(AMDM) -http: //nomenclator.amed.md/